



NAUJOS KARTOS EFEKTYVUS ŽARNYNO PARUOŠIMAS



MAŽAS TŪRIS

1 LITRAS VAISTO,
praskiesto vandeniu + 2 litrai skysčių

98,4%

VEIKSMINGAS

VALYMAS¹

pagal dviejų
dienų schemą



UNIKALUS RINKINYS SU MATAVIMO TAURELE

ir jau paruoštu tirpalu,
kurio nereikia tirpinti



ĮTRAUKTAS Į 2019 M. ESGE GAIRIŠ²

Veikliosios medžiagos:
bevandenis natrio sulfatas,
magnio sulfatas heptahidratas
ir kalio sulfatas



fortrans®

Makrogolis 4000 su elektrolitais

LAIKO PATIKRINTAS AUKSINIS STANDARTAS

DIDELIS TŪRIS

4 LITRAI TIRPALO



NUMERIS 1
GASTROENTEROLOGŲ
pasirinkimas Lietuvoje³

1
NR

SUDĖTYJE YRA
ELEKTROLITŲ



Gali būti rekomenduojamas
PACIENTAMS TURINTIEMS
GRETUTINIŲ LIGŲ^{2,4}



Veikliosios medžiagos:
makrogolis 4000,
bevandenis natrio sulfatas, natrio-
vandenilio karbonatas, natrio
chloridas, kalio chloridas



INDIKACIJOS

Eziclen® yra skirtas suaugusiųjų žarnynui valyti prieš procedūras, kurias atliekant žarnynas turi būti švarus (pvz., žarnyno apžiūra (įskaitant endoskopiją ir radiologinį tyrimą) arba chirurginę procedūrą).

RINKINYJE YRA



2 buteliukai **paruošto trijų sulfato druskų tirpalo**.

Matavimo taurelė, kuria pacientas gali **lengvai pamatuoti**, kiek vaisto ir vandens ar skaidrių skysčių išgėrė ruošdamasis procedūrai.

Trisulfato veiksmingumas pagal naujausias 2019 m. ESGE gaires²



Trisulfatas pranašesnis už natrio pikosulfatą + magnio citratą.^{2,5}



Trisulfatas nėra prastesnis už didelio tūrio PEG ir 2 L PEG askorbatą.^{2,5}

Vartojant Eziclen® pasiekiamas labai geras vartojimo rekomendacijų laikymasis ir aukštas žarnyno išvalymo efektyvumas.⁶

Lengva suvartoti – vaisių kokteilio skonis ir patogi matavimo taurelė tiksliai dozavimui.



INDIKACIJOS

Fortrans® skirtas suaugusiems, vartojamas storosios žarnos išvalymui prieš atliekant endoskopinius, radiologinius tyrimus bei storosios žarnos operacijas.

Gali būti rekomenduojamas pacientams turintiems gretutinių ligų:²

- ☹️ lėtinis inkstų nepakankamumas,
- ☹️ stazinis širdies nepakankamumas,
- ☹️ kepenų nepakankamumas su ascitu.

4 VANDENYJE TIRPINAMŲ MILTELIŲ PAKELIUOSE YRA

MAKROGOLIO 4000

- ☹️ Veikia osmosiškai, sulaikydamas ir padidindamas vandens kiekį žarnyne.
- ☹️ Veikia tik žarnyne (nesuyra ir neabsorbuojamas į kraujotaką).
- ☹️ Nefermentuojamas žarnyno bakterijų, todėl mažesnė pilvo pūtimo tikimybė.

ELEKTROLITŲ

- ☹️ Fortrans sudėtyje esantis elektrolitų kiekis subalansuotas taip, kad nevyktų elektrolitų pokyčiai tarp žarnyno ir kraujotakos.

Didelio tūrio PEG veiksmingumas pagal naujausias 2019 m. ESGE gaires²



Didelio tūrio PEG pranašesnis už mažo tūrio PEG.^{2,5}



Skoniui pagerinti vaistą galima ištirpinti atvėsintame vandenyje, įpilti citrinos sulčių arba čiulpti mėtinius saldainius.⁷



1. Gastrointest Endosc. 2010 Aug;72(2):328-36. 2. Hassan et al. Endoscopy 2019;51(8):775-94. 3. SoftDent ataskaita pagal ATC vaistų klasifikaciją: A6AD65, A06AD10, A06AB58 ir A06AD, rinkos duomenys MAT 2024/08 - 2025/07. 4. Gretutinės ligos: lėtinis inkstų nepakankamumas, stazinis širdies nepakankamumas, kepenų nepakankamumas su ascitu. 5. Paveikslėliai adaptuoti pagal Lietuvos rinkoje esančius žarnyno paruošimo preparatus. 6. Regula et al. Endosc Int Open 2020;8(3):E247-56 7. Stanford Health Care. Colonoscopy Preparation Instructions [Internetas]. 2018 Sep 6. <https://stanfordhealthcare.org/content/dam/SHC/treatments/e/docs/colonoscopy-prep-revised-sep-6-2018.pdf>



VIENOS DIENOS SCHEMA

Pirmoji ir antroji dozės vartojamos tą pačią dieną

Tyrimo data ir laikas:

► PIRMOJI DOZĖ

Data: Laikas:



Taikant vienos dienos schemą, vaistas suvartojamas dieną prieš tyrimą. Pradėkite vartoti vaistą gydytojo nurodytu laiku.

Nuo šios akimirkos negalima vartoti kietojo maisto!

1



Atsukti vieną (1-q) Eziclen® vaisto buteliuką ir supilti jo turinį į pakuotėje pridamą taurelę.

2



Įpilti vandens į vaistą **iki taurelėje nurodyto brūkšnio** ir išmaišyti.

3



Per 30–60 minučių **palengva** išgerti visą taurelėje esantį skystį.

4



LABAI SVARBU per kitas 60 minučių **išgerti dar dvi (2) iki brūkšnio pripildytas taureles vandens** ar skaidraus skysčio.

► ANTROJI DOZĖ

Data: Laikas:



Antroji vaisto dozė geriama praėjus maždaug dviem valandoms nuo pirmojo buteliuko turinio vartojimo pradžios.

1



Atsukti vieną (2-q) Eziclen® vaisto buteliuką ir supilti jo turinį į pakuotėje pridamą taurelę.

2



Įpilti vandens į vaistą **iki taurelėje nurodyto brūkšnio** ir išmaišyti.

3



Per 30–60 minučių **palengva** išgerti visą taurelėje esantį skystį.

4



LABAI SVARBU per kitas 60 minučių **išgerti dar dvi (2) iki brūkšnio pripildytas taureles vandens** ar skaidraus skysčio.



DVIEJŲ DIENŲ SCHEMA

Pirmoji dozė vartojama dieną prieš tyrimą, o antroji – tyrimo dieną

Tyrimo data ir laikas:

► PIRMOJI DOZĖ

Data: Laikas:



Taikant dviejų dienų schemą, vaistas suvartojamas per du kartus: dieną prieš procedūrą vakare ir procedūros dieną ryte. Pradėkite vartoti vaistą gydytojo nurodytu laiku.

Nuo šios akimirkos negalima vartoti kietojo maisto!

1



Atsukti vieną (1-q) Eziclen® vaisto buteliuką ir supilti jo turinį į pakuotėje pridėdamą taurelę.

2



Įpilti vandens į vaistą **iki taurelėje nurodyto brūkšnio** ir išmaišyti.

3



Per 30–60 minučių **palengva** išgerti visą taurelėje esantį skystį.

4



LABAI SVARBU per kitas 60 minučių **išgerti dar dvi (2) iki brūkšnio pripildytas taureles vandens** ar skaidraus skysčio.

► ANTROJI DOZĖ

Data: Laikas:



Antroji vaisto dozė vartojama tyrimo dienos rytą.

1



Atsukti vieną (2-q) Eziclen® vaisto buteliuką ir supilti jo turinį į pakuotėje pridėdamą taurelę.

2



Įpilti vandens į vaistą **iki taurelėje nurodyto brūkšnio** ir išmaišyti.

3



Per 30–60 minučių **palengva** išgerti visą taurelėje esantį skystį.

4



LABAI SVARBU per kitas 60 minučių **išgerti dar dvi (2) iki brūkšnio pripildytas taureles vandens** ar skaidraus skysčio.

PASIRUOŠIMAS TYRIMUI – MITYBA*

3–1 diena iki tyrimo datos	✓ REKOMENDUOJAMA: • lengvai virškinamas maistas • skaidrūs negazuoti gėrimai, kurie nedažo raudona ir purpurine spalva • arbata arba kava (be pieno ir be grietinėlės) ✗ NEVARTOTI: • daržovių ir vaisių, kuriuose yra smulkių kauliukų (vynuogių, kivių, braškių), ir jų produktų, pvz., uogienių • sėklų (saulėgrąžų, moliūgų, linų sėmenų, aguonų ir pan.) • juodos duonos • gazuotų gėrimų, alkoholio, pieno
1 dieną iki tyrimo datos	• suvalgyti lengvus pusryčius, kuriuose yra mažai skaidulinių medžiagų, pvz., virtas kiaušinis, baltos duonos riekė, jogurtas be priedų • likusią dienos dalį gerti tik skaidrius skysčius: vandenį, arbatą, šviesių spalvų perkoštas vaisių sultis (be minkštimo), gryną arba perkoštą sriubą be kietųjų dalelių • galima čiulpti ledinukus
Tyrimo dieną	• suvartoti Eziclen® preparatą, kaip nurodė gydytojas • gerti tik skaidrius skysčius • valgyti negalima

Vaistą vartoti reikia pabaigti:

- jei nebus taikoma anestezija – mažiausiai likus 1 valandai iki procedūros.
- jei bus taikoma anestezija – mažiausiai likus 2 valandoms iki procedūros.

DĖMESIO! Kadangi viduriavimas sukelia dehidrataciją, **LABAI SVARBU GRIEŽTAI LAIKYTIS ŠIAME LANKSTINUKE PATEIKIAMŲ NURODYMŲ** ir gerti tinkamą kiekį papildomų skaidrių skysčių (be paties vaisto). **NESILAIKANT NURODYMŲ, GALI TEKTI PAKARTOTI TYRIMĄ IR VISĄ PASIRUOŠIMO PROCEDŪRĄ.**

- Jeigu tyrimas planuojamas bendrinėje nejautroje (narkozėje), būtina atvykti su lydinčiu asmeniu, kuris parlydės pacientą namo.
- Po tyrimo visą likusią dieną nerekomenduojama vairuoti, dirbti su mechanizmais, dirbti aukštyje.

Paciento vartojami vaistai ir pasiruošimas tyrimui: visus pakeitimus, kaip iki tyrimo vartoti vaistus, būtina aptarti su gydytoju.

Eziclen koncentratas geriamajam tirpalui

Sudėtis. 1 buteliukas, kuriame yra apie 176 ml koncentrato (195,375 g): 17,510 g bevandenio natrio sulfato, 3,276 g magnio sulfato heptahidrato, 3,130 g kalio sulfato. 2 buteliukai, atitinkantys 2 x apie 176 ml koncentrato (390,750 g): 35,020 g bevandenio natrio sulfato, 6,552 g magnio sulfato heptahidrato, 6,260 g kalio sulfato. **Terapinės indikacijos.** Eziclen yra skirtas suaugusiųjų žarnynui valyti prieš procedūras, kurias atliekant žarnos turi būti švarus (pvz., žarnyno apžiūra (įskaitant endoskopiją ir radiologinį tyrimą) arba chirurginę procedūrą). Eziclen neskirtas vidurių užkietėjimo gydymui. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Vartoti per burną. Žarnynui tinkamai išvalyti reikia dviejų Eziclen butelių. Prieš vartojant kiekvieno buteliuko turinį reikia praskiesti vandeniu iš viso iki bendro 0,5 litro tūrio ir per 2 valandas suvartoti dozę bei papildomai išgerti 1 litrą vandens arba skaidrių skysčių. Išsami informacija pateikiama preparato charakteristikų santraukos (PCS) 4.2 skyriuje. **Kontraindikacijos.** Eziclen negalima vartoti pacientams, kuriems nustatyta: padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms ar bet kuriai pagalbinei medžiagai; stazinis širdies nepakankamumas; ženklus bendrosios sveikatos būklės pablogėjimas, pvz., stipri dehidracija; ūminis virškinimo trakto uždegimo fazės, įskaitant Krono (*Crohn*) ligą, opinį kolitą; ūminis pilvo sutrikimas, susijęs su operacija, pvz., ūminis apendicitas; nustatyta arba įtariama virškinimo takų obstrukcija (užsikimšimas); nustatyta ar įtariama virškinimo trakto perforacija (prakiurimas); skrandžio išsitsuštinimo sutrikimai (pvz., skrandžio parėzė ar stazė); nustatytas arba įtarimas *ileus* (žarnų nepraeinamumas); toksinis kolitas arba toksinė didelė gaubtinė žarna (*megacolon*); pykinimas ir vėmimas; ascitas; sunkus inkstų funkcijos nepakankamumas (glomerulų filtracijos greitis <30 ml/min./1,73m²). **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Atsižvelgiant į galimą dehidraciją ir sunkių elektrolitų pusiausvyros sutrikimų riziką, prieš skiriant Eziclen pacientams, kuriems gresia rizika, reikia atidžiai įvertinti naudos ir rizikos santykį. Visiems pacientams reikia patarti prieš vartojant Eziclen, jį vartojant ir suvartojus gerti reikiamą skysčių kiekį. Jeigu pacientui suvartojus vaisto kyla sunkus vėmimas arba atsiranda skysčių praradimo (dehidracijos) požymių, reikia taikyti skysčių pusiausvyrą atkuriančias priemones, kad būtų išvengta galimos su skysčių ir elektrolitų pusiausvyros sutrikimais susijusių sunkių komplikacijų (pavyzdžiui, traukulių ar širdies aritmijos) rizikos. Dehidratacija gali sukelti funkcinį inkstų nepakankamumą, kuris gali būti grįžtamas vartojant atitinkamų skysčių. Daugiau informacijos pateikta PCS 4.4 skyriuje. **Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika.** Itin atsargiai preparatą reikia skirti pacientams, vartojantiems kalcio kanalų blokatorius, diuretikus, ličio gydymą arba vaistus, kurie gali paveikti elektrolitų kiekį. Rekomenduojama atsargiai vartoti preparatus, kurie žinoma, kad ilgina QT intervalą. Ypač didelės įtakos gali turėti gydomajam poveikiui reguliariai vartojamų vaistų, kuriems būdingas siauras terapinis intervalas ar trumpas pusinio skilimo laikas (t.y. geriamieji kontraceptikai, vaistai epilepsijai, diabetui gydyti, antibiotikai, levotiroksinas, digoksinas). **Nepageidaujamas poveikis.** Labai dažnas: pilvo tempimas, pilvo skausmas, pykinimas, vėmimas, nemalonūs pojūtis. Daugiau informacijos pateikiama PCS 4.8 skyriuje. Specialistai, pastebėję šalutinį poveikį ir (ar) gavę informacijos apie tai, turi pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt ar kitu būdu, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Apie šalutinį poveikį taip pat praneškite registruotojo vietiniam atstovui: Mayoly Baltics UAB, el. paštu vigilance.BAL@mayoly.com. **Registruotojas.** MAYOLY PHARMA FRANCE, Prancūzija. **Atstovas Lietuvoje.** Mayoly Baltics UAB. **Pakuotė.** Dėžutėje yra du buteliukai ir taurelė. **Receptinis vaistinis preparatas. Teksto peržiūros data.** 2025-02-16.


fortrans®

Makrogolis 4000 su elektrolitais



PASIRUOŠIMAS KOLONOSKOPIJAI

Vienos dienos režimas



Vakare prieš tyrimo dieną išgerti 4 litrus osmosinio tirpalo **Fortrans®**. Paketėlio turinį ištirpinti 1 litre negazuoto vandens ir suvartoti jį per vieną valandą (kaip nurodė gydytojas).

Išgėrus vieną litrą, paruošti ir pradėti gerti antrąją tirpalo dozę.



Indikacija. Žarnyno išvalymas prieš atliekant endoskopiją, radiologinius tyrimus arba storosios žarnos operacijas.

Vienas litras paruošto tirpalo skirtas 15-20 kg kūno masės, tokiu būdu vidutinė vaistinio preparato dozė yra 3-4 litrai tirpalo.


fortrans®

Makrogolis 4000 su elektrolitais



PASIRUOŠIMAS KOLONOSKOPIJAI


Padalintų dozių režimas



Vakare prieš tyrimo dieną išgerti 2 litrus osmosinio tirpalo **Fortrans®**. Paketėlio turinį ištirpinti 1 litre negazuoto vandens ir suvartoti jį per vieną valandą (kaip nurodė gydytojas).



Išgėrus vieną litrą, paruošti ir pradėti gerti antrąją tirpalo dozę.



Ryte tyrimo dieną paruošti ir išgerti kitus 2 litrus osmosinio tirpalo **Fortrans®**. Paketėlio turinį ištirpinti 1 litre negazuoto vandens ir suvartoti jį per vieną valandą (kaip nurodė gydytojas). Rekomenduojama paskutinę vaisto dalį suvartoti likus 3-4 valandoms iki numatomos procedūros.



Išgėrus vieną litrą, paruošti ir pradėti gerti antrąją tirpalo dozę.



Indikacija. Žarnyno išvalymas prieš atliekant endoskopiją, radiologinius tyrimus arba storosios žarnos operacijas.

Vienas litras paruošto tirpalo skirtas 15-20 kg kūno masės, tokiu būdu vidutinė vaistinio preparato dozė yra 3-4 litrai tirpalo.

PASIRUOŠIMAS TYRIMUI – MITYBA*

3–1 diena iki tyrimo datos	☒ REKOMENDUOJAMA: • lengvai virškinamas maistas • skaidrūs negazuoti gėrimai, kurie nedažo raudona ir purpurine spalva • arbata arba kava (be pieno ir be grietinėlės) ☒ NEVARTOTI: • daržovių ir vaisių, kuriuose yra smulkių kauliukų (vynuogių, kivių, braškių), ir jų produktų, pvz., uogienių • sėklų (saulėgrąžų, moliūgų, linų sėmenų, aguonų ir pan.) • juodos duonos • gazuotų gėrimų, alkoholio, pieno
1 dieną iki tyrimo datos	• suvalgyti lengvus pusryčius, kuriuose yra mažai skaidulinių medžiagų, pvz., virtas kiaušinis, baltos duonos riekė, jogurtas be priedų • likusią dienos dalį gerti tik skaidrius skysčius: vandenį, arbatą, šviesių spalvų perkoštas vaisių sultis (be minkštimo), gryną arba perkoštą sriubą be kietųjų dalelių • galima čiulpti ledinukus
Tyrimo dieną	• suvartoti Fortrans® preparatą, kaip nurodė gydytojas • gerti tik skaidrius skysčius • valgyti negalima

Vaistą vartoti reikia pabaigti:

- jei nebus taikoma anestezija – mažiausiai likus 1 valandai iki procedūros.
- jei bus taikoma anestezija – mažiausiai likus 2 valandoms iki procedūros.

DĖMESIO! Kadangi viduriavimas sukelia dehidrataciją, **LABAI SVARBU GRIEŽTAI LAIKYTIŠ ŠIAME LANKSTINUKE PATEIKIAMŲ NURODYMŲ** ir gerti tinkamą kiekį papildomų skaidrių skysčių (be paties vaisto). **NESILAIKANT NURODYMŲ, GALI TEKTI PAKARTOTI TYRIMĄ IR VISĄ PASIRUOŠIMO PROCEDŪRĄ.**

- Jeigu tyrimas planuojamas bendrinėje nejautroje (narkozėje), būtina atvykti su lydinčiu asmeniu, kuris parlydės pacientą namo.
- Po tyrimo visą likusią dieną nerekomenduojama vairuoti, dirbti su mechanizmais, dirbti aukštyje.

Paciento vartojami vaistai ir pasiruošimas tyrimui: visus pakeitimus, kaip iki tyrimo vartoti vaistus, būtina aptarti su gydytoju.

Fortrans milteliai geriamajam tirpalui paketėlyje

Sudėtis. Kiekviename paketėlyje yra 64 g makrogolio 4000, 5,7 g bevandenio natrio sulfato, 1,68 g natrio-vandenilio karbonato, 1,46 g natrio chlorido, 0,75 g kalio chlorido. **Terapinės indikacijos.** Žarnyno išvalymas prieš atliekant endoskopiją, radiologinius tyrimus arba storosios žarnos operacijas. Vaistas skirtas tik suaugusiems. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Vartoti per burną. Viename paketėlyje esantys milteliai ištirpinami 1 litre vandens. Viskas gerai išmaišoma, kol milteliai ištirpsta. Vienas litras paruošto tirpalo skirtas 15 – 20 kg kūno masės, tokiu būdu vidutinė vaistinio preparato dozė yra 3 – 4 litrai tirpalo. Vaistinis preparatas gali būti suvartojamas per vieną kartą arba padalinus dozę per du kartus. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Sunkus širdies nepakankamumas. Ženklus bendros paciento būklės pablogėjimas (pvz. dehidratacija). Pažengusios stadijos storosios žarnos karcinoma arba bet kokia kita storosios žarnos patologija, dėl kurios jos gleivinė tampa itin trapi. Sunki ūminė virškinimo trakto uždegimo stadija, įskaitant Krono ligą (*Crohn's disease*) ir opinį kolitą. Virškinimo trakto perforacija ar jos išsivystymo rizika. Pacientams, kuriems gali išsivystyti ar kuriems jau yra žarnų nepraeinamumas (*ileus*) arba virškinamo trakto obstrukcija arba stenozę. Skrandžio ištuštinimo sutrikimas (pvz., gastroparezė, gastrostazė). Toksinis kolitas arba toksinė didelė gaubtinė žarna (*megacolon*). Vaikai ir jaunesni kaip 18 metų paaugliai, nesant klinikinių duomenų apie vaistinio preparato vartojimą šio amžiaus grupei. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vyresnio amžiaus ligoniams, kurių bendra būklė yra silpna, vaistinį preparatą galima vartoti tik esant aktyviai medicininei priežiūrai. Žinoma, kad vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra makrogolio, gali sukelti alergines reakcijas (odos bėrimą, dilgėlinę, angio-neurozinę edemą), anafilaksinio šoko atvejus. Pacientai, turintys elektrolitų pusiausvyros sutrikimų, turėtų juos koreguoti prieš vartodami žarnyno valymui skirtus preparatus. Šį vaistinį preparatą atsargiai turėtų vartoti pacientai, turintys gretutinių ligų arba derinyje vartojantys vaistinių preparatų, galinčių padidinti vandens ir elektrolitų pusiausvyros sutrikimų riziką arba esant būklėms, galinčioms padidinti galimų komplikacijų riziką, pavyzdžiui, pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi, sergantiems širdies nepakankamumu ir derinyje vartojantiems diuretikų. Šį vaistinį preparatą reikia itin atsargiai skirti linkusiems į aspiraciją, iš lovos nesikeliantiems pacientams arba pacientams, kurių neurologinės funkcijos ar motorinė veikla sutrikusi, nes vartojant vaistinio preparato kyla aspiracinės pneumonijos pavojus. Dėl perteklinio vandens kiekio širdies ar inkstų nepakankamumu sergantiems pacientams gresia ūminės plaučių edemos pavojus. **Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika.** Tikėtina, kad dėl fortrans vartojimo atsiradęs viduriavimas gali stipriai sutrikdyti kitų kartu vartojamų vaistinių preparatų absorbciją. **Nepageidaujamas poveikis.** Labai dažnas: pykinimas, pilvo skausmas, pilvo pūtimas; dažnas: vėmimas. **Praneškite apie šalutinį poveikį.** tel. (8-700) 33305 arba e-paštu pharmacovigilance.baltic@ipsen.com. Specialistai, pastebėję šalutinį poveikį ir (ar) gavę informacijos apie tai, turi pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt ar kitu būdu, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt **Registruotojas.** IPSEN Consumer HealthCare, Prancūzija. **Atstovas Lietuvoje.** IPSEN Pharma Lietuvos filialas, T. Narbuto g. 5, Vilnius. **Klasifikavimas.** Receptinis vaistinis preparatas. **Pakuotė ir jos turinys.** Kartono dėžutėje yra 4 paketėliai po 73,69 g miltelių. **Teksto peržiūros data.** 2021-08-10. **Prieš skirdami Fortrans, perskaitykite išsamią vaistinio preparato charakteristikų santrauką.** Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje <http://www.vvkt.lt>