

GARDASIL9 injekcinė suspensija užpildytame švirkšte – devyniavalentė vakcina nuo žmogaus papilomaviruso (rekombinantinė, adsorbuota).

Kas yra GARDASIL9 ir kam jis vartojamas.

GARDASIL9 yra vaikams bei paaugliams nuo 9 metų ir suaugusiems skirta vakcina. Ji leidžiama norint apsaugoti nuo ligų, kurias sukelia 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ar 58 tipo žmogaus papilomavirusas (ŽPV). Šios ligos yra: moters lyties organų (gimdos kaklelio, vulvos ir makšties) ikivėžinės pažeidimai ir vėžys, išangės ikivėžinės pažeidimai ir vėžys bei vyrų ir moterų lyties organų karpas. GARDASIL9 yra skirtas apsaugoti nuo šių ligų. ŽPV sukeltų ligų gydymui ši vakcina nevartojama. GARDASIL9 yra iširtas su 9-26 metų berniukais ir vyrais bei 9-45 metų mergaitėmis ir moterimis. GARDASIL9 vartoti draudžiama, jeigu Jums arba Jūsų vaikui: • yra alergija bet kuriai iš veikliųjų medžiagų arba bet kuriai pagalbinei šios vakcinos medžiagai; • sulėidus GARDASIL arba SILGARD (6, 11, 16 ir 18 tipo ŽPV) arba GARDASIL9 dozė išsivystė alerginė reakcija.

Išėjimai ir atsargumo priemonės.

Pasitarkite su gydytoju, vaistininku arba slaugytoju, jeigu Jūs arba Jūsų vaiko: • yra sutrikęs kraujo krešėjimas (kraujuoja ilgiau nei įprastai), pavyzdžiui, yra hemofilija; • imuninė sistema yra nusilpusi, pavyzdžiui, dėl genetinio defekto, ŽIV infekcijos arba imuninę sistemą slopinančių vaistų vartojimo; • jeigu Jūs arba Jūsų vaikas serga liga, kurios metu sunkiai karščiuoja. Vis dėlto nežymiai padidėjusi kūno temperatūra ar nesunki viršutinių kvėpavimo takų infekcija (pavyzdžiui, peršalimas) nėra priežastis atidėti skiepėjimą. Skiepėjimas nepakeičia įprastos gimdos kaklelio vėžio profilaktikos programos. Jeigu esate moteris, Jums reikės toliau laikytis Jūsų gydytojo patarimų nuolat atlikti gimdos kaklelio tepinėlių (Pap tyrimą) bei naudoti prevencines ir apsaugojimo priemones. Apsaugos trukmė iki šiol nėra žinoma.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis.

Jeigu esate nėščia, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš skiepįdamasi šia vakcina pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. GARDASIL9 galima suleisti krūtimi maitinančioms ar ketinančioms žindyti motinoms.

Kaip leidžiamas GARDASIL9.

Jeigu pirmosios injekcijos metu esate nuo 9 iki 14 metų (imtinai): GARDASIL9 gali būti skiriamas pagal 2 dozių schemą: pirmoji dozė suleidžiama pasirinktą dieną; antroji dozė suleidžiama po pirmosios injekcijos praėjus nuo 5 iki 13 mėnesių. Antrąją vakcinos dozę suleidus anksčiau nei praėjus 5 mėnesiams po pirmosios dozės, visada būtina suleisti trečiąją dozę. GARDASIL9 gali būti skiriamas pagal 3 dozių schemą: pirmoji dozė suleidžiama pasirinktą dieną; antroji dozė suleidžiama po pirmosios injekcijos praėjus 2 mėnesiams (ne anksčiau kaip po vieno mėnesio nuo pirmosios dozės); trečioji dozė suleidžiama po pirmosios injekcijos

Įrašas remiamas MSD farmacinės kompanijos. Dėl informacijos apie skiepus prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą. Skiepavimo programos leidimo Nr.: LG-25. Vaistinio preparato GARDASIL9 pakuotės lapelio informacija: <https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/25792>

praėjus 6 mėnesiams (ne anksčiau kaip po 3 mėnesių po antrosios dozės). Visos trys dozės turi būti suleistos per vienerius metus.

Jeigu pirmosios injekcijos metu esate 15 metų ir vyresni: GARDASIL9 turi būti skiriamas pagal 3 dozių schemą: pirmoji dozė suleidžiama pasirinktą dieną; antroji dozė suleidžiama po pirmosios injekcijos praėjus 2 mėnesiams (ne anksčiau kaip po vieno mėnesio nuo pirmosios dozės); trečioji dozė suleidžiama po pirmosios injekcijos praėjus 6 mėnesiams (ne anksčiau kaip po 3 mėnesių po antrosios dozės). Visos trys dozės turi būti suleistos per vienerius metus. Žmonėms, kuriems buvo suleista pirmoji GARDASIL9 dozė, skiepimo kursą rekomenduojama užbaigti vakcina GARDASIL9. GARDASIL9 bus suleistas per odą tiesiai į raumenis (geriau žasto arba šlaunies raumenį).

Pamiršus vieną GARDASIL9 dozę.

Jeigu pamiršote planuotą dozę, Jūsų gydytojas nuspręs, kada Jums suleisti praleistąją dozę. Svarbu laikytis Jūsų gydytojo arba slaugytojo nurodymo, kada turite vėl pas jį apsilankyti kitos vakcinos dozės. Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Galimas šalutinis poveikis.

Ši vakcina, kaip ir visos kitos, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Suleidus GARDASIL9 gali būti stebimi šie šalutiniai reiškiniai. Labai dažni (gali pasireikšti ne rečiau kaip 1 iš 10 asmenų): šalutinis poveikis injekcijos vietoje (skausmas, patinimas ir paraudimas) ir galvos skausmas. Dažni (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 10 asmenų): šalutinis poveikis injekcijos vietoje (kraujosruvys ir niežulys), karščiavimas, nuovargis, švairgys ir pykinimas. Nedažni (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 100 asmenų): padidėję limfmazgiai (kakle, pažastyje ar kirkšnyje), dilgėlinė, alpimas, kartais kartu su traukuliais arba sąstingiu, vėmimas; sąnarių skausmas, raumenų skausmas, neįprastas nuovargis ar silpnumas, šaltkrėtis, bendras negalavimas, mazgelis injekcijos vietoje. Reti (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 1000 asmenų): alerginės reakcijos. Pranešta apie alpimo, kartais kartu su traukuliais arba sąstingiu, atvejus. Nors alpimo epizodų pasireiškia nedažnai, po vakcinos nuo ŽPV suleidimo pacientų būklė reikia stebėti 15 minučių.

Teksto paskutinės peržiūros data – 2026 06 19.

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje <http://www.ema.europa.eu>. Dėl informacijos apie skiepus prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą. Skiepavimo programos leidimo Nr. LG-25.

Pranešimas apie šalutinį poveikį. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu: NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt

Kas tave stabdo?

Neleisk tam tikriems su ŽPV* susijusiems vėžiniams susirgimams pakeisti Tavo planų

*ŽPV – žmogaus papilomavirusas



Kas yra ŽPV?

ŽPV, arba žmogaus papilomavirusas, yra didelė, daugiau kaip 200 virusų grupė.¹ Šie virusai gali užkrėsti įvairias kūno vietas, pavyzdžiui, gimdos kaklelį, makštį, vulvą, išangę ir kt.¹ Apie 80 proc. lytiškai aktyvių žmonių tam tikru gyvenimo laikotarpiu užsikrečia ŽPV virusais patys to nežinodami, nes perserga be simptomų ir komplikacijų.¹

Kas gali užsikrėsti ŽPV?

ŽPV virusai gali plisti lytiniu keliu per infekuotą gleivinę, dažniausiai vaginalinių, analinių ir oralinių lytinių santykių metu.² Be to, ŽPV virusai gali būti perduodami per odos sąlytį su infekuota gleivine intymaus kontakto metu.²

Kaip ŽPV susijęs su gimdos kaklelio vėžiu?

Paprastai imuninė sistema ŽPV pašalina per 2 metus, tačiau užsilikęs ŽPV iki 10 % gali sukelti ląstelių pokyčius, galinčius peraugti į gimdos kaklelio vėžį.² Kelių tipų ŽPV laikomi didelės rizikos virusais, 16-ojo ir 18-ojo tipo ŽPV sukelia apie 70 proc. visų ŽPV priskiriamų gimdos kaklelio vėžio atvejų pasaulyje.² Gimdos kaklelio vėžio patikros programa kartu su vakcinacija yra efektyviausias būdas užkirsti kelią gimdos kaklelio vėžiui.²

Ar ŽPV gali sukelti ir kitas ligas?

ŽPV nediskriminuoja asmenų pagal amžių ir lytį bei gali paliesti tiek vyrus, tiek moteris.² Tam tikri aukštos rizikos ŽPV tipai gali sukelti vulvos, makšties, išangės vėžį.² Žemos rizikos 6 ir 11 tipai gali sukelti lyties organų karpas.²

Aš nebesu tokia jauna, ar man vis dar reikia nerimauti dėl ŽPV?

Nesvarbu, kiek Tau metų, rizika užsikrėsti ŽPV infekcija visada išlieka.³ ŽPV infekcijos paplitusios tarp suaugusiųjų, didžiausią riziką keldamos šiais gyvenimo tarpsniais: nuo 18 iki 24 metų ir nuo 45 iki 49 metų.³ Nors daugumą infekcijų mūsų organizmas pašalina pats, kai kurios iš jų ilgai gali sukelti ląstelių pokyčius, galinčius išsivystyti į gimdos kaklelio vėžį ar kitas minėtas su ŽPV susijusias ligas.²

Ar galiu pasiskiepyti nuo ŽPV, jei jau turiu nustatytą ŽPV tipą?

ŽPV sukelti pakitimai ar nustatyta ŽPV infekcija nėra kontraindikacija skiepytis.⁴ Vakcina gali padėti išvengti ligų, susijusių su pakartotine ŽPV infekcija ar kitais ŽPV tipais.⁵

Ar vakcinacija gali pakenkti vaisingumui?

Neigiamas vakcinacijos nuo ŽPV poveikis vaisingumui nenustatytas.⁴

Ar vakcina nuo ŽPV skiriama tik iki lytinių santykių pradžios?

Rekomenduojama pasiskiepyti nuo ŽPV jaunesniame amžiuje, prieš lytinių santykių pradžią.² Taip siekiama užtikrinti, kad dar nesate susidūrusi su kažkuriuo ŽPV tipu.² Tačiau tyrimai rodo reikšmingą klinikinį vakcinos veiksmingumą ir suaugusiems asmenims iki 45 m. amžiaus.⁴ Daugelis suaugusiųjų galėjo būti susidūrę ne su visais ŽPV tipais, kurių sukeliama ligų gali padėti išvengti vakcinacija.^{4,6-8}

Kokie yra vakcinos šalutiniai reiškiniai?

Labai dažnas šalutinis poveikis: galvos skausmas, injekcijos vietos skausmas, patinimas ir paraudimas.⁴ Dažnas: svaigulys, pykinimas, karščiavimas, nuovargis, injekcijos vietos niežulys ir kraujosruva.⁴ Šie šalutiniai reiškiniai paprastai yra nesunkūs ar vidutinio sunkumo.⁴

Ar vakcinacija naudinga, jei esu monogaminiuose santykiuose?

Abejonės, ar skiepytis, jei esu monogaminiuose santykiuose, ganėtina dažnos. JAV atliktas perspektyvus kohortinis tyrimas⁹, kuriame dalyvavo 35–60 m. moterys, parodė, kad ~70 % naujai nustatytų aukštos rizikos ŽPV infekcijų pasireiškė moterims, esančioms monogaminiuose santykiuose^b. Taip pat verta apsvarstyti galimybę pasiskiepyti, nes galite būti užsikrėtę ne visais ŽPV tipais, kurių sukeliama ligų vakcina padeda išvengti.^{4,6-8}

Ar vakcina pakankamai ištirta?

ŽPV vakcinų saugumo duomenys patvirtinti daugiau nei 20 metų trukusiais ŽPV vakcinų klinikiniais tyrimais ir realaus pasaulio įrodymais.⁴

^a Kaip buvo įvertinta „ŽPV perimenopauziniame tyrime“, kurio metu Baltimorėje, Merilando valstijoje, nuo 2008 m. kovo mėn. iki 2011 m. kovo mėn. buvo įtrauktos 731 35–60 metų moterys, o vėliau buvo atlikta nauja aptikimo analizė.⁹

^b Apibrėžiama kaip seksualinė veikla su tuo pačiu partneriu per pastaruosius 6 mėnesius.⁹

Šaltiniai:

1. ECDC, 2020. Guidance on HPV vaccination in EU countries: focus on boys, people living with HIV and 9-valent HPV vaccine introduction. **Prieiga:** <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidance-hpv-vaccination-eu-focus-boys-people-living-hiv-9vhpv-vaccine>
2. WHO: Questions and Answers about HPV, 2024. **Prieiga:** <https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2024-5631-49185-73415>
3. Sanjose, S. et al. (2007). Worldwide prevalence and genotype distribution of cervical human papillomavirus DNA in women with normal cytology: a meta-analysis.
4. GARDASIL9 preparato charakteristikų santrauka. Teksto paskutinės peržiūros data: 2026 06 19. **Prieiga:** https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/gardasil-epar-product-information_en.pdf
5. Reuschenbach M, Doorbar J, Del Pino M, et al. Prophylactic HPV vaccines in patients with HPV-associated diseases and cancer. *Vaccine*. 2023;41(42):6194-6207.
6. Meites E et al. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2019;68:698–702.
7. Ferris DG et al. *Papillomavirus Res*. 2020;10:100202.
8. Tota JE et al. *Clin Infect Dis*. 2022;74:1247–1256.
9. Paul P, Hammer A, Rositch AF, et al. Rates of New Human Papillomavirus Detection and Loss of Detection in Middle-aged Women by Recent and Past Sexual Behavior. *J Infect Dis*. 2021;223(8):1423-1432.